



Generalmente sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento e massime sopra i 30°.

Non sono previste piogge se non modeste nel tardo pomeriggio di giovedì 8 e mercoledì 14 luglio (da confermare).

Tuttavia è sempre possibile, come in alcune zone è accaduto domenica scorsa, la formazione di nubi temporalesche ad oggi non prevedibili.

Per questo è sempre bene controllare il meteo periodicamente anche per regularsi nell'effettuare eventuali trattamenti.

OLIVO

FASE FENOLOGICA: frutticini da <5 mm a >5mm (secondo luoghi e varietà)

MOSCA DELL'OLIVO

MONITORAGGI

LOCALITÀ	Catture del 29.06.2021	Catture del 06/07.07.2021				
SASSAIA	Zero	Zero				
MONTECCHIO	Zero	Zero				
FRATTA FRATTICCIOLA	Zero	Zero				
SODO SANT'EUSEBIO	Zero	Zero				
S. PIETRO A CEGLILO	Zero	Zero				

MEZZAVIA PECIANO	Zero	Zero				
TERONTOLA ALTA	Zero	Zero				
TERONTOLA BASSA	N.P.*	Zero				
TECOGNANO	N.P.*	Zero				
CASTAGNO	N.P.*	Zero				
PERGO	N.P.*	Zero				
FARNETA	N.P.*	Zero				

(*) Non Pervenute

Anche in questa ultima settimana (colonna evidenziata in giallo) catture assenti. Non sono necessari interventi.

Siamo ancora in una fase fenologica non idonea per la riproduzione della mosca, Si ricorda, infatti, che l'eventuale l'attività di ovideposizione della femmina di *Bractrocera oleae* (mosca dell'olivo) inizia dalla fase fenologica di **indurimento del nocciolo**.

TIGNOLA DELL'OLIVO

La prima generazione che attacca i fiori è terminata. Installare le trappole. Nel caso della tignola le trappole forniscono indicazioni circa la curva di volo delle generazioni, ma non una stima effettiva della popolazione larvale. Questa dovrà essere valutata in funzione delle infestazioni dello scorso anno (drupe colpite con caratteristica galleria procedente dal peduncolo verso il nocciolo). La soglia di intervento è valutata tramite il riscontro della presenza delle uova sui frutticini e delle prime olive attaccate. In caso di cascola di olive con la sintomatologia descritta contattare i tecnici.

CICLOCONIO O OCCHIO DI PAVONE

I trattamenti a base di rame sono in genere già stati effettuati.

ROGNA DELL'OLIVO

La malattia è presente in molti areali olivicoli pertanto, si può affermare che il potenziale infettivo sia importante in tutti gli ambienti. I trattamenti a base di rame possiedono un effetto batterio statico quindi, **in concomitanza di grandinate**, è **INDISPENSABILE** effettuare un intervento entro 24-36 ore dall'evento grandinigeno.

Trattamenti eseguiti più tardivamente non sortiscono alcun effetto. Altre strategie di contenimento della malattia nei bollettini autunnali.

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL COMUNE DI CORTONA ALLA SEGUENTE MAIL:

suap@comune.cortona.ar.it

O I TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

COLDIRETTI – MONTESI LUIGI 3475560170

CIA – BANINI ENZO 3488013493 e DEL PULITO ANDREA 3488013450

UNIONE AGRICOLTORI – VILLANI DAMIANO 3488078837