



Generalmente sereno con temperature in aumento rispetto a questi ultimi giorni sia nelle minime che nelle massime. Queste si assesteranno sopra i 32-34° arrivando, localmente, a toccare anche punte più alte. Controllare il meteo periodicamente per regolarsi nell'effettuare eventuali trattamenti.

OLIVO

FASE FENOLOGICA: ingrossamento drupe

MOSCA DELL'OLIVO

MONITORAGGI

| LOCALITÀ | Catture del 28/29.06.2022 | Catture del 05/06.07.2022 | Catture del 12/13.07.2022 | | |
|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| SASSAIA | 0 | 0 | 1 | | |
| MONTECCHIO | 0 | 0 | 5 | | |
| VALTRITO | 0 | 0 | 5 | | |
| FRATTA | 0 | 0 | 5 | | |
| FRATTICCIOLA | 2 | 1 | 4 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|-------|-------|--|--|
| SODO | 0 | 0 | 10 | | |
| SANT'EUSEBIO | 0 | 1 | 2 | | |
| S. PIETRO A CEGLIOLO | 0 | 0 | 1 | | |
| MEZZAVIA PECIANO | 0 | 1 | 1 | | |
| TERONTOLA ALTA | 0 – 1 | 0 – 0 | 4 – 7 | | |
| CAMPACCIO | 0 | 0 | 0 | | |
| FANTOCCHIO | 0 | 0 | 0 | | |
| OSSAIA | 0 | 0 | 0 | | |
| PERGO | N.P. (*) | 0 | 0 | | |
| FARNETA | 0 | 0 | 0 | | |

(*) N.P. non pervenuta

Non siamo ancora in una fase fenologica idonea per la riproduzione della mosca. Si ricorda, infatti, che l'eventuale attività di ovideposizione della femmina di *Bractrocera oleae* (mosca dell'olivo) inizia dalla fase fenologica di **indurimento del nocciolo**.

Vista la fase fenologica ancora non recettiva all'attività di questo fitofago e le catture ancora, per la maggior parte dei casi, basse o a zero, **non sono necessari interventi**.

TIGNOLA DELL'OLIVO

Installare le trappole che tuttavia, nel caso della tignola, forniscono indicazioni circa la curva di volo delle generazioni, ma non una stima effettiva della popolazione larvale. Questa dovrà essere valutata in funzione delle infestazioni dello scorso anno (drupe colpite con caratteristica galleria procedente dal peduncolo verso il nocciolo). La soglia di intervento è valutata tramite il riscontro della presenza delle uova sui frutticini e delle prime olive attaccate. In caso di cascola di olive con la sintomatologia descritta contattare i tecnici.

COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE

Soprattutto là dove l'anno precedente se ne fosse riscontrata la presenza, cominciare a controllare visivamente le piante se presentano questo fitofago, facilmente riconoscibile proprio per la caratteristica forma di un granello di pepe diviso a metà degli scudetti (ovvero le femmine adulte della specie) contenenti al loro interno le uova che, quando si schiudono generalmente attorno alla metà di luglio, generano numerosissime neanidi.

Nei nostri areale in genere, sia per le condizioni climatiche avverse, sia per il numerosi antagonisti naturali, questo fitofago non genera grossi danni. È comunque buona norma tenerlo sotto controllo visivo contattando il tecnico se lo si ritiene necessario.

CICLOCONIO O OCCHIO DI PAVONE

I trattamenti a base di rame sono in genere già stati effettuati.

ROGNA DELL'OLIVO

La malattia è presente in molti areali olivicoli pertanto, si può affermare che il potenziale infettivo sia importante in tutti gli ambienti. I trattamenti a base di rame possiedono un effetto batterio statico quindi, **in concomitanza di grandinate**, è **INDISPENSABILE** effettuare un intervento entro 24-36 ore dall'evento grandinigeno.

Trattamenti eseguiti più tardivamente non sortiscono alcun effetto. Altre strategie di contenimento della malattia nei bollettini autunnali.

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL COMUNE DI CORTONA ALLA SEGUENTE MAIL:
suap@comune.cortona.ar.it

O I TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

COLDIRETTI – MONTESI LUIGI 3475560170

CIA – BANINI ENZO 3488013493 e DEL PULITO ANDREA 3488013450

UNIONE AGRICOLTORI – VILLANI DAMIANO 3488078837