



Per tutta la settimana generalmente sereno o poco nuvoloso con temperature massime che risaleranno anche sopra i 32-33°.

Eventuali piogge sono attese casomai per martedì.

In questa stagione è tuttavia sempre possibile la formazione di nubi temporalesche ad oggi non prevedibili. Per questo è sempre bene controllare il meteo periodicamente anche per regolarsi nell'effettuare eventuali trattamenti.

## OLIVO

**FASE FENOLOGICA:** accrescimento frutticini – inizio indurimento nocciolo  
(secondo luoghi e varietà)

### MOSCA DELL'OLIVO

#### MONITORAGGI

LOCALITÀ	Catture del 29.06.2021	Catture del 06/07.07.2021	Catture del 13/14.07.2021	Catture del 20/21.07.2021		
SASSAIA	Zero	Zero	1	1		
MONTECCHIO	Zero	Zero	0	0		
FRATTA FRATTICCIOLA	Zero	Zero	0 - 3	1 4		
SODO SANT'EUSEBIO	Zero	Zero	2	4		
S. PIETRO A CEGLIOLO	Zero	Zero	0	1		
MEZZAVIA PECIANO	Zero	Zero	0	0		
TERONTOLA ALTA	Zero	Zero	2 - 0	15- 3		

TERONTOLA BASSA	N.P.*	Zero	2	4		
TECOGNANO SANT'ANGELO	N.P.*	Zero	3	6		
CASTAGNO	N.P.*	Zero	1	6		
PERGO	N.P.*	Zero	1	4		
FARNETA	N.P.*	Zero	0	2		

(\*) Non Pervenute

Anche in questa ultima settimana (colonna evidenziata in giallo) le catture sono a zero o comunque sotto soglia (a parte un caso isolato). Non sono necessari interventi.

Siamo ancora in una fase fenologica non idonea per la riproduzione della mosca, Si ricorda, infatti, che l'eventuale l'attività di ovideposizione della femmina di *Bractrocera oleae* (mosca dell'olivo) inizia dalla fase fenologica di completo **indurimento del nocciolo**.

Si rammenta che comunque le alte temperature inibiscono sia gli accoppiamenti che lo sviluppo delle eventuali uova.

### TIGNOLA DELL'OLIVO

Installare le trappole. Nel caso della tignola le trappole forniscono indicazioni circa la curva di volo delle generazioni, ma non una stima effettiva della popolazione larvale. Questa dovrà essere valutata in funzione delle infestazioni dello scorso anno (drupe colpite con caratteristica galleria procedente dal peduncolo verso il nocciolo). La soglia di intervento è valutata tramite il riscontro della presenza delle uova sui frutticini e delle prime olive attaccate. In caso di cascola di olive con la sintomatologia descritta contattare i tecnici.

### CICLOCONIO O OCCHIO DI PAVONE

I trattamenti a base di rame sono in genere già stati effettuati. Non sono necessari trattamenti.

### ROGNA DELL'OLIVO

La malattia è presente in molti areali olivicoli pertanto, si può affermare che il potenziale infettivo sia importante in tutti gli ambienti. I trattamenti a base di rame possiedono un effetto batterio statico quindi, **in concomitanza di grandinate**, è **INDISPENSABILE** effettuare un intervento entro 24-36 ore dall'evento grandinigeno.

Trattamenti eseguiti più tardivamente non sortiscono alcun effetto. Altre strategie di contenimento della malattia nei bollettini autunnali.

**PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL COMUNE DI CORTONA ALLA SEGUENTE MAIL:**

[suap@comune.cortona.ar.it](mailto:suap@comune.cortona.ar.it)

**O I TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI**

**COLDIRETTI – MONTESI LUIGI 3475560170**

**CIA – BANINI ENZO 3488013493 e DEL PULITO ANDREA 3488013450**

**UNIONE AGRICOLTORI – VILLANI DAMIANO 3488078837**